

N 44



Catirá-vermelho

Parece ser somente humma variedade do Catirá branco, com a differença de serem as folhas maiores, e mais grossas, e o cerne da madeira de cor bruna avermelhada mais carregada.

Uzo Sirve bem para obras de construcão expostas ao temporal.

Peso especifico - 1,000




eg

Tam

La

Ma

q



Cativa Branco

Folhas
e galhos

Folia impari, pinnata, foliolis oblonge ovatis,
sensilibus, emarginatis, occurrentibus

De ambos os lados são as folhas lisas: os galhos são
alternados, e a casca branca suja.

Tamanho

He humma arvore de dous palmos de diametro,
e bem feita.

Casca

A casca he de cor bruna grizea com Escas fi-
nas pelo seu comprimento, e com altor, e baixos na
superficie; no interior he de cor de canella, e de
grossura de humma linha.

Madeira

A madeira verde he branca com Escas sujas,
mas depois fica de cor amarella avermelhada; não
he muito Esja, mas fina, e boa de se trabalhar.

Uzo

Bom madeira de construcão.

Peso especifico - 1,000 ate - 0,888.



Fall
1901

Fall

Con

Mar

W



Calixi

Folhas. *Folia impari, pinata, foliolis sub-oppositis.*
e galhos Cinco pares estão sempre oppositos, e hum só na
ponta. As folhas novas, assim como os galhos,
apparecem no mez de Agosto.

Tamanho *He arvore, que apenas tem hum palmo de*
diametro.

Casca *A casca he de cor verde esbranquiçada suja, fina-*
mente ciscada, e de humma linha de grossura.

Madeira *Amadure he branca, mas verde muda a cor no*
corte em amarella avermelhada; he fina, e cacha
bem direito.

Uzo *Para obras de construcão, e de marcinaria*

Uso especifico 0,933.



Folha
egre
Jama
Cra
Made
Vza

Yao-pardo

Folhas,
e galhos

*Folia opposita, petiolata, ovato lanceolata,
margine reflexa*

A parte superior he verde escura; a inferior mais clara, com veias grossas, e cobertas de cabellos amarellos, e asperos. Os galhos novos são redondos, e cobertos de cabellos finos, que apalpando-se parece velbutina, e de cor bruna.

Tamanho

He hum arvore bonita, de tronco direito, e de $1\frac{1}{2}$ palmos de diametro.

Casca

A casca na superficie he de cor grizca verdoenga, com pequenas lachas pelo seu comprimento, e lachosa de modo, que facilmente as lascas se despegao, e por baixo apparece hum camada de cor de carne escuro; no interior he bruna, da grossura de 1 linha.

Madeira

A madeira he toda de cor vermelha bruna; as camadas exteriores alguma coisa mais claras; secando, desmaia hum pouco; eija, fina,asca bom, e boa p.^a serrar.

Uzo

Bom madeira para construcão

Peso especifico



Folia
eg
Tam
Ca
Ma
Uz



Marmelle

Folhas,
e galhos

Folia petiolata, alterna, ovata, acuminate, integra
De ambos os lados são lisas, no superior mais es-
curas, que no inferior. A casca dos galhos novos
he de cor bruna com pintas brancas; os galhos mais
antigos são mais claros com as mesmas pintas.

Tamanho

He arvore de $1\frac{1}{2}$ palmos de diametro

Casca

A casca na superficie he cor de prata, e lisa
com pequenas excrescencias brancas; no interior
he bruna, e tem se meia linha de grossura.

Madeira

A madeira he branca brunada, mas na super-
ficie toma no ar humma cor de ferrugem; he bas-
tantemente dura, não muito fina, e facil de se ser-
rar, e trabalhar nella.

Uzo

Madeira de construcão não exposta ao ar.

Peso especifico. . . 0,823



Folha
1ª

Tamara

Caro

Madeira

Uruguai



Cambolla-vermelho

Folhas, e galhos Folia alterna, impari pinnata, foliolis subsessilibus ovatis, irregulariter bi-dentatis.

A parte superior verde escura, e luzidia; a inferior verde clara, e bassa. Hum tallo tem 3 ate 5 pares de folhas, e hum so na ponta. A carca dos galhos novos he branca amarelhada.

Tamanho He arvore de $1\frac{1}{2}$ palmos de diametro, e mal feita.

Carca A carca na superficie he de cor de cinza com pequenas, e interrompidas lachas; no interior he vermelha, secando fica bruna, e de quatro linhas de grossura.

Madeira A madeira he branca brumada suja, com cerne vermelho bruno, e irregular; he fija com fibras grossas, e ma' de se trabalhar.

Uzo Para obras de construcão de baixo de coberta.



*Felice
e gale*

*Tama
Cau*

Ma

Ux



Canella de Viado.

Folhas
e galhos

*Folia alterna, petiolata, foliolis petiolatis, lanceo-
latis ad basin, et apicem acute acuminatis,
emarginatis.*

Da parte de cima são de cor verde escura, da de baixo
bassas. Os galhos são alternados, e a casca delles
branca suja com pequenas excrescencias.

Tamanho

He arvore de dois palmos de diametro.

Casca

A casca na superficie he de cor de cinza com pe-
quenas excrescencias, mas em geral he lisa; no
interior he branca, e apenas da grossura de $\frac{1}{4}$ de linha.

Madeira

A madeira he branca clara com esplendor
arsetinado, ao ar fica a superficie de cor de enxo-
fre claro; he tija, fina, e boa de se trabalhar.

Uzo

Madeira de construcão, onde não fique expor-
ta ao rigor do tempo.

Peso especifico 0,909.



Fell
eg
Tama
Can
Ma
Uz



Pão ferro

Folhas. Folia alterna, petiolata, oblonga ovata.
e galhos São lisos de ambos os lados, muito esplandecentes
na parte superior, na inferior bassas, e muito incor-
padas. A casca dos galhos novos he verde.

Tamanho He arvore de palmo e meio de diametro.

Casca A casca na superficie he de cor de cinza escura,
lamellosa, fina com fissas impressas, e atravessadas;
por baixo dellas he a casca de cor bruna, e apenas da
grossura de humna folha de papel grosso.

Madeira A madeira he de cor amarella esbranquiçada, e de-
pois, exposta algum tempo ao ar, toma na superficie
humna cor de enxofre; he cija, e bastante fina.

Uzo Para construcão de baias de coberta

Peso especifico 1,124



Folha
egala
Tamara
Casa
Ma
Ux



Bom Successe verdadeiro

Folhas,
e galhos

Folia petiolata, opposita, oblonge ovata, obtuse
acuminata, integra.

Os galhos são oppositos, e chatos no entremcio de duas
e duas folhas. A casca he bruna, e finamente Escal-
da no seu comprimento: produz humma fructa, que
amadurece no mez de Novembro, e se come.

Tamanho

He arvore de hum palmo de diametro.

Casca

A casca na superficie he bruna verdeenga, la-
mellora, fina, solta, e finamente annellada; no in-
terior he bruna, e de grossura de humma linha.

Madeira

A madeira he branca, e com Escas mais escuras,
fina, pouco Eja, e facil de trabalhar-se.

Uzo

Para obras de construcão.



*For
e ga*

Tama

Car

Ma

Uxo



Siciupira

Folhas, Folia pinnata, foliolis petiolatis, alternis.
e galhos oblongis, ovatis, emarginatis, margine reflexa, integra.
 A parte superior he lica, verde escura, e muito esplan-
 decente; a inferior amarella esbranquiçada, com cabel-
 los finos. O tollo commun na parte superior tem
 humma cova profunda; na parte inferior mais arredondo.
 Os galhos novos são alternados, e a casca delles de cor
 de cinza coberta, com pequenas excruncencias.

Tamanho He arvore de $1\frac{1}{2}$ palmos de diametro, e neste
 Sertão mal feita; e achase só na beira do mato.

Casca A casca na superficie he cheia de rugas, e esca-
 mas de cor de prata. Estando verde, o interior he de
 cor vermelha bruna; secando, fica bruna, de $\frac{3}{4}$ de
 polegada de grossura.

Madeira As camadas exteriores são brancas amareladas;
 o cerne cor de Chocolate; muito fija, e curvada, de modo q
 não se pode caxhar, ao m^{to} tempo fina; e má de trabalhar-se.

Uzo. Para obras de construcção, e eixos de carros.

Peso especifico . . . 1,285





Yac-lento

Folhas e galhos *Folia impari pinnata, foliolis oppositis, cuneiformibus, obtuse acuminatis, margine ciliata.*

Os galhos são alternados, e a casca dos novos he amarelhada.

Tamanho He arvore de 2, a 3 palmos de diametro, com tronco direito.

Casca A casca na superficie he cor de cinza avermelhada, e aspera; no interior, estando verde, he branca avermelhada; secando, he bruna avermelhada, e a camada exterior verde amarelhada.

Madeira A madeira he branca amarelhada nas camadas exteriores; nas interiores branca avermelhada. tem fibras grossas, mas facha bem, e he facil de trabalhar-se. Tem o nome, por dar humma frusta, que serve para tintos de jogar.

Uzo Madeira para construcão, e para taboado.

Peso especifico..... 0,791





Viuna preta

*Folhas,
e galhos*

Folia petiolata, opposita, oblonge ovata, acuminata, margine integra, reflexa

Folhas ao reflexo do Sol, apparecem ellas cheias de pontinhos transparentes, que são maiores pelos cantos. Os galhos são oppositos e a casca delles liza, e bruna: em Agosto brota novos.

Tamanho

He arvore de 1 $\frac{1}{2}$ palmos de diametro, com tronco direito.

Casca

A casca na superficie he de cor bruna escura, aspera, e lamellosa; no interior, estando verde, he bruna verdinha, secando, bruna denegrida, e de 2 a 3 linhas de grossura.

Madeira


A madeira he de cor bruna escura, muito fija, fina, e boa de trabalhar se.

Uzo

Bom madeira de construcão; e a casca tingue de preto com lodo.

Peso especifico 1,000





Guina

Folhas,
e galhos

Folia opposita, petiolata, ovate lanceolata, acute
acuminata, integra, margine reflexa
As veias apenas se observao.

Famamho

He humma arvore de dois palmos de diametro,
e bem direita.

Casca

A casca he exterior, e interiormente de cor bruna
esbranquiçada, de grossura de humma linha.

Madeira

A madeira he brunaca, eija, lancia, fina, e
cacha bem.

Uzo

Para obras de construcão. Com a casca se tinge
de preto em lode.

Peso especifico 1,173

191

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting on the right margin]





Gambui

Folhas, e galhas. *Folia opposita, subsessilia, lanceolata.*
Os galhas são oppositos, e formão com o tronco hum angulo de 45 graus, tendo por isso a corôa humna figura piramidal ovada.

Tamanho He arvore de 1 palmo de diametro, que parece muito com a jaboticabeira. Tronco canellado, e torcido.

Madeira A madeira he branca suja, fina, eija, lãscosa, muy elastica, e cacha difficilmente.

Uzo Lenço uzo fazem della; os Indios se servem dos paos novos para arcos.

Peso especifico 1,111



F...
eg...
Jam...
Ca...
Ma...
U...

Gambui de folha larga

Folhas e galhos. *Folia opposita, petiolata, ovata, acuminata, integra.*

De ambos os lados são lisas; os tallos muito curtos, cedondos, e acanellados da parte de cima.

Os galhos são oppositos, e a casca he lisa, e de cor verde grizea.

Tamanho He arvore de $1\frac{1}{2}$ palmos de diametro, com tronco muu torcido, e acanellado.

Casca A casca na superficie he lisa, com pequenas viscas longitudinaes, e coberta de hum bolor, que lhe dá huma apparencia ondiada; no interior, estando verde, he de cor de macans verdes; secando, fica de cor bruna, e he de grossura de huma linha.

Madeira A madeira he branca avermelhada sem cerne, lascosa, torta, e cacha difficilmente.

Uzo Não se faz uzo algum della; e só as canellas direitas servem para cabos de machados.

Leio especifico 0,933.




Folk
gale

Fam

Can

Al

W



Goiveira do mato

Folhas, e
galhos.

*Folia petiolata, opposita, ovata, acuminata,
integra.*

De ambos os lados são lisas, e encorpadas: os
galhos oppositos, e a casca delles de cor bruna clara.

Tamanho

He arvore de $1\frac{1}{2}$ palmos de diametro, de tronco
mal feito, e acancellado; muitas vezes he tomada
por Pitanga.

Casca

A casca he lisa com malhas verdes brunas, e
brancas, de grouura de humna folha de papel.

Madeira

A madeira he branca avermelhada, eija, fina,
e má de se trabalhar.

Uzo

Para obras de construcão.

Peso especifico 1,052





Bom successo
(Myrtus)

Folhas,
e galhos.

As folhas são como as da *Liuna*, porém maiores, e mais grossas.

Tamanho

He humma arvore de $4\frac{1}{2}$ palmos de diametro.

Casca

A casca he bruna clara na superficie, e finam^{te} circada; raspada a superficie, apparece de humma cor vermelha viva: no interior he verde; e secando de cor bruna clara, de grossura de 3 linhas.

Madeira

A madeira he bruna esbranquiçada, fina, e custosa de se trachar, mas racha direito

Uzo

A casca da humma tinta preta como a *Liuna*.
Serve para obras de construcão.

Peso especifico..... 0,909.



Faint handwritten text visible on the right edge of the page, including words like "Fam", "Ca", "Ma", and "U".

Mojece, ou quatro capotes

Folhas,
e galhos

*Folia alterna, pari pinnata, foliis sessilibus,
linearibus, emarginatis.*

Na parte superior são mais curvas, que na inferior. O tallo commun onde sahe do galho, está metido entre duas espinhas semelhantes ás folhas. Os galhos são alternados, e a casca dos novos he de cor cinza escura.

Tamanho

He humma arvore, que tem até dois palmos de diametro, e bem lançada.

Casca

A casca na superficie he cor de cinza, e alguma cousa aspera; no interior, estando verde, he vermelha, seca, fica bruna.

Madeira

A madeira he de cor branca suja, e divide se em 4, ou 5 anneis, ou linhas circulares, de que emana hum sumo cor de sangue.


Uzo

A cinza da madeira serve nos cortumes, por fazer o effecto da cal viva em tirar os cabellos dos coiros: as lascas do piaó servem bem para com ellas tocar as cordas de Viola; fora disto não tem uzo nenhum.

Pero especifico 0,929.



F. de
egat
F.
Tam
Ca
Ma
U



Amecaga
(*Amigra*)

Folhas *Folia impari pinnata, foliis petiolatis, oppositis, oblongis acuminatis, cum acumine obtusa. Ordinariamente estão 3, ou 4 pares si hum tallo.*

Tamanho *He arvore de 1 $\frac{1}{2}$ palmos de diametro, de tronco cedondo; e no mez de Agosto conserva ainda as folhas velhas*

Casca *A casca na superficie he branca grizea com pequenas excrescencias; no interior, estando verde, he vermelha, e muda depois para cor bruna; de grossura de 2 $\frac{1}{2}$ linhas.*

Madeira *As camadas exteriores são amarellas avermealhadas; o cerne vermelho bruno; he. Cija, larcosa, fina, e facha com difficuldade. Nasce em lugares altos, e secos, mas, segundo dizem, dá se melhor em lugares humidos, como beiradas de Eios.*

Uzo *A madeira não tem uso algum, nem mesmo para se queimar, por que a fumaca motiva dores de cabeça. Tem hum cheiro activo, e não desagradavel, e dá hum afixina m. usada na Pharmacia.*



N^o 63

Ameciga vermelha


Não se differença em coisa alguma da anterior, se não em ser a madeira de cor mais escura, e não ter cheiro algum.

Uxo Servem se pouco della.

Peso específico 0,715.



Toth
e galh



64

Bico de Jacano

Folhas,
e galhos.

*Folia petiolata, alterna, obovata, oblonga,
acuminata*

A parte superior destas folhas encorpadas he de cor verde escura, e Escrilandecente; a inferior clara. Os nervos de ambos os lados são levantados, forem ainda mais na parte inferior. O tato na parte superior

tem hum a impressao longitudinal; na inferior
he cecidendo; e a ponta das folhas he algum tanto
virada para traz.

Tamanho He hum a arvore de 2 palmos de diametro.

Casca A casca he de cor bruna clara com Eugas, e de
 $1\frac{1}{2}$ linhas de grossura.

Madeira A madeira he branca, e luxidia, de fibras algum
tanto grossas, mole, eacha bem, mas impenna fa-
cilmente.

Uzo Nao tem uzo especial. A fruta he mui
procurada pelos Tacanos, e daqui o seu nome.

Letra especifico 0,573



N 65



Trifugeira
(*Myrtus*)

Folhas e galhos *Folia opposita, petiolata, lanceolata, integra.*
De ambos os lados são lisas, e a parte superior mais escura que a inferior. Os galhos novos são oppositos, e a casca cor de cinza.

Tamanho He arvore de 1 $\frac{1}{2}$ palmos de diametro, cujo tronco he acanellado.

Casca A casca he cor de cinza, com pequenas covas longitudinaes; no interior he bruna esbranquiçada suja, da grossura de 1 linha.

Madeira A madura he de cor grizca bruna, e as camadas exteriores mais sujas; he cija, fina, e facil de se cortar.

Uzo Para obras de construcção, não exposta ao ar.

Peso especifico..... 0,928



Fa
equ
Fam
Car
Ma
U



Lão de Rato

- Folhas, e galhos.* *Folia subpetiolata, opposita, lanceolata, integra.*
Os galhos estão oppositos, e encurvados.
- Tamanho.* *He arvore de 1 palmio de diametro.*
- Casca.* *A casca parece muito com a da Liuna, mas no interior he cor de Coza suja, da grossura de humma linha.*
- Madeira.* *A madeira he de cor branca avermelhada, eija, laseira fina, e Cacha direito, mas difficilmente.*
- Uzo.* *He muy pouco uzada, por empenar muito; as frutas são muito procuradas pelos Eatos, d'onde o seu nome.*



Folha
e galha

Tama
Casc

Meado

Ux

Pitanga
(*Eugenia*)

Folhas,
e galhos

*Folia petiolata, opposita, ovate lanceolata, obtuse
acuminata, margine exflexa, integra.*

As folhas novas são avermelhadas. Os galhos novos
opostos, e a casca delles he branca amarelhada lisa.
Florece no mez de Agosto.

Tamanho

He arvore de 2 palmos de diametro.

Casca

A casca na superficie he amarella esverdeada
suja; no interior amarella brunada, de grossura
de humna linha. Tem espathados pequenos espinhos.

Madeira

A madeira he de cor branca suja, laseira, fina,
direita, e cacha bem.

Uzo

Nenhum, por empenar muito. Produz fructas,
que se comem, e tem o nome, da semelhanca, que
tem com a verdadeira Pitangueira.

Peso especifico. 1,036




Tellu
egat

Tam
Ca

Ma

Vz



Congonha brava

Folhas,
e galhas

Folia alterna, petiolata, ob-ovata, oblonga,
cigida, integra.

Da parte de cima são de cor verde escura; da de baixo
esbranquiçadas, e lisas. No mez de Agosto brota
novas folhas.

Tamanho

He arvore de $1\frac{1}{2}$ palmos de diametro.

Casca

A superficie da casca he desigual, e branca ver-
doenga suja; o interior he amarello grizeo sujo, de
granura de $2\frac{1}{2}$ linhas.

Madeira

A madeira he de cor branca suja, lencosa, com-
prida, e direita, pouco cija, e racha bem. Tem
o seu nome da semelhanca com a verdadeira Con-
gonha.

Uzo

Nenhum, por empenar muito.

Peso especifico. 0,719



Folha
e gal
Tama
Caso
Muda
Uz

Congenha com cortica

- Folhas.* *Folia alterna, ovata, ciliata, margine undulata e gálhos.* No mez de Agosto brota novas folhas, e galhos.
- Tamanho.* He humma arvore de 2 palmos de diametro.
- Casca.* A casca he de cor amarella grizea, de 2 linhas de grossura, e como cortica na superficie.
- Madeira.* A madeira he branca amarelhada, ondecada, laseira fina, direita, e cheira bom.
- Uzo.* Nenhum, por ser muito sujeita á broca

Peso especifico. 0,666



Folia
egala
Tam
Ca
Ma
U



Piso trifolius, com folhas dentadas.

Folhas,
egalthos

*Folia ternata, foliolis ovatis, acuminatis
dentatis*

A parte superior he mais luxidia, que a inferior.

Tamanho

*He arvore de 1 $\frac{1}{2}$ palmos de diametro, cujo
tronco tem alto, e baixos, e nunca he redondo, sen-
do tambem torto.*

Casca

*A superficie da casca he de cor bruna escura, e
hum pouco cicada; o interior he bruno claro, de
humma linha de grossura.*

Madeira

*A madeira he branca amarelhada, eija, fina,
mui tinaz, e cacha torta, e difficilmente.*

Uzo

Nenhum.




Folha
e galh
Tama

Ca

Ma

U



Pão azul

Folhas, e galhos. *Folia opposita, petiolata, ovata, acuminata, crenata. Os galhos estão oppositos.*

Tamanho. *He arvore de 1½ palmos de diametro, com tronco bem lencado.*

Casca. *A casca he de cor bruna clara, e a superficie fofa, e Circada; de duas linhas de grossura.*

Madeira. *A madeira verde he de cor branca amarelhada; secando, toma superficialmente humma cor azul celeste; he fina, pouco tija, e racha bem. Cortando-se a arvore, dá de si hum cheiro adocado desagradavel.*

Uxo. *Nenhum.*

Peso especifico. *0,864*



Felipe
egale



São valente

Folhas,
e galhos

*Folia opposita, oblonge ovata, petiolata, obtuse
acuminata, integra.*

*Brota folhas, e flores no mez de Agosto; e cada folha
tem na parte superior nos principios dos nervos hum
penacho de cabellos asetinados.*

Tamanho

Tamanho He arvore de 1² palmos de diametro, com tronco cheio de grandes tumores, e excrescencias; mas a corôa della he mui asombrada, e bella.

Casca A superficie he grizca escura, e aspera; o interior amarelado, secando fica vermelho, e de 2 linhas de grossura.

Madeira A madeira verde he branca, mas logo toma a cor de Coza, e tem o cernic bruno; he mui fija, fibrosa, torta, e difficil de se cachar.

Uzo Nenhum.

Terro especifico 1, 128





São de Coxa

Folhas, *Folia pelioclata, ovata, acuminata, emarginata.*
e galhos. Da parte de cima são de cor verde escura; da de baixo verde amarelhada. Os galhos são alternados.

Tamanho He árvore de hum palmo de diametro, de tronco
côndido, e coroa pequena.

Casca A superficie da casca he cor de cinza, e fibrosa;
o interior de cor brunada.

Madeira A madeira he branca, com cerne cor de Coxa
desmaiada; fina, eja, e difficil de se echar.

Uzo Nenhum.

Peso especifico 0,916



San
San
San
San



Pau Coco

Folhas, *Folia petiolata, alterna, ovate lanceolata, integra.*
egalthos Da parte de cima são as folhas lisas; da de baixo
 tem cabellos finos. Os galhos novos apparecem
 no mez de Agosto, e estão cobertos de cabellos de cor
 bruna amarelhada.

Tamanho He arvore de hum palmo de diametro; o tron-
 co he torcido, e não decendo, mas he comprido, e
 tem hum coroa pequena.

Casca A casca na superficie he grizca, Cachada,
 fofa, e cahc facilmente; no interior he de cor de
 canella.

Madeira A madeira he de cor bruna avermelhada, mas
 desmaia depois; he fija, e cahc facilmente, mas
 torto.

Uzo Nenhum.

Peso especifico 1,060




Felipe
egre

Jamón

Cas

Ma

U



Tigueira do Mato

Folhas,
e galhos

Folia quaternata, foliolis cuneiformibus,
obtusè emarginatis.

A parte superior he verde, a inferior verde amarelada, e cheia de lãa. Os tallos comuns estao alternados, assim como os galhos.

Tamanho

He arvore de $1\frac{1}{2}$ palmos de diametro, de tronco torto, e mal feito.

Casca

A casca na superficie he grizca, e hum pouco cachada, tanto no comprimento, como atravessada. Estando verde, he ella cor de sangue, mas secando torna se cor de canella; de grossura de 4 linhas.

Madeira

A madeira he branca avermelhada suja, muito molle, tem fibras pouco grossas, eacha bem, e direito.

Uzo

Nenhum

Peso especifico 0,560



F
eg
Tam
Ca
M
U



Aga
(*Bignonia*)

Folhas, *Folia quinata, foliolis obovatis, acute acuminalis.*
e galhos Os tallos tem na parte superior humma incisao, e
estao espathados no fim dos galhos. Os galhos
formao forquilha.

Tamanho He humma arvore de $1\frac{1}{2}$ palmos de diametro,
bem feita, de tronco cedondo, direito, e alto, com
coroa pequena.

Casca A superficie da casca he bruna grizea, fibrosa,
cachada pelo seu comprimento, e de grossura de
 $1\frac{1}{2}$ linha

Madeira A madeira he branca brunada, eija, e racha
bem.

Uzo Nenhum.

Peso especifico 0,822

La
eg
La
to
Ma
Q

Angu - João mole - S.^m Joze -
 Pão de sal - Pão Cusso.

Folhas, Folia opposita, subsessilia, ovata, integra
 e galhos. Secando as folhas, ficam logo de cor negra.

Tamanho He arvore de hum palmo de diametro.


Casca A casca he de cor bruna esbranquiçada, lisa,
 e fina.

Madeira A madeira he branca, fibrosa, grossa, molle,
 e tacha bem.

Uxo Nenhum: só a casca, e folhas servem para
 tingir de preto.

Peso especifico 0,900





Espinho de Rozeta

Folhas, e galhos. *Folia alterna, petiolata, oblonga, acuminata, dentata.*

Na parte superior são mais escuras, que na inferior. Os tallos são curtos, e da parte de cima, e de baixo com pequena incisão.

Tamanho. He arvore de 1 palmo de diametro.


Carca. A carca exterior he mui fachaada, lamellosa, e tem muitas excrecencias; cheia de hum bolor branco, e bruno; no interior, estando verde, he avermelhada; seica, he de cor de canella, de 2 linhas de grossura, e coberta de espinhos compridos, e muito agudos, sahindo sempre varios de hum pé commun.

Madeira. A madeira verde he vermelha esbranquiçada, e estando algum tempo exposta ao sol, torna hum cor amarella de Asafrão: não he muito fina, e facha bem.

Uzo. Nenhum. Os espinhos no Sertão servem de alfinetes.

Peso especifico. 1,000





Leiteiro

Folhas, e
galhos

Folia petiolata, oblonga, acule acuminata,
dentata.

Na parte superior são lisas, e de cor verde; na inferior esbranquiçadas, e baixas. Os talos são arredondos, e tem na parte superior hum pequena incisao, e onde principia a folha, pequenas excrecencias como xifras. A casca dos galhos novos he bruna, e cincada.

Tamanho

He arvore de $1\frac{1}{2}$ palmos de diametro.

Casca

A casca he grizea, quasi lisa, mas tem Cachas largas, em arvores velhas de quasi 2 polegadas de grossura, nas mais novas de 4, ou 5 linhas. Cortando se verde, emana della, assim como da madeira, hum sumo cor de leite, d'onde osu nome.

Madeira

A madeira he branca, de fibras grossas, Cachas bem, e em lascas compridas.

Uzo

Nenhum. Apodrece facilmente.

Peso especifico..... 0,500



Grandifolia

Folhas Folha oblonga, petiolata, alterna, setacea.
e galhos As folhas são de 6 ate 10 polegadas de comprimento, e na parte inferior finamente cabeludas.
 Os galhos novos estão também cobertos de cabellos asselinados, e são alternados; a casca delles he cor de cinza, e coberta de pequenas excrescencias.

Tamanho He arvore de 1 ate 2 palmos de diametro, e bem nascida.

Casca A casca superficialmente he de cor bruna escura, e rachada em pequenos, e irregulares quadradões, e he cija; no interior he de cor de canella, e de 3 linhas de grossura.

Madeira A madeira he branca amarelhada, mais escura no interior, cija, algum tanto fina, mas molle para se trabalhar nellas.

Uzo Nenhum

Peso especifico..... 0,750





Pão bonito

Folhas Folia alterna, ovata, acute acuminata,
e galhos A casca nos galhos novos he verde.

Tamanho He arvore de hum palmo de diametro, e bonita.

Casca Na superficie he a casca esbranquiçada, e Ca-
chada quasi em regulares quadrados, que estao
mais altos; no interior he bem branca, estando ver-
de, mas perde a sua cor, e fica amarelhada; de
grossura de huma linha.

Madeira A madeira verde he de huma cor amarella cla-
ra; seca fica branca brunada; he eija, fina, e
boa de se trabalhar.

Uzo Nenhum.

Peso especifico 0,866



Felha
e galha

Tama

Car

Ma

U





Pao de Macaco

Folhas, e galhos *Folia alterna, petiolata, deltoidea, acuminata, integra*

Hum lado he mais largo que outro, e hum pouco virado, e de ambos sao lisas, e finas. Produz frutas semelhantes aos caixos de bananas, que amadurecem no mez de Agosto.

Tamanho He arvore de hum palmo de diametro, com tronco bem direito.

Casca A casca na superficie he cor de cinza, e como cortica; no interior de cor bruna escura, e de 5 a 5 linhas de espessura.

Madeira A madeira he branca amarelhada, molle, pouco fina, e boa de se trabalhar.

Uzo Quasi nenhum. Tem o seu nome por ser a fruta mui procurada pelos Macacos.

Peso especifico 1,000



*Foto
e gao*

Sam

Ca

Ala

Q



Arvore sem nome
(Bignonia)

Folhas,
e galhos

Folia alterna, petiolata, quinata, foliolis
oblonge obovatis, integris.

A parte superior he verde escura, e pouco aspera;
a inferior verde clara, e cabelluda. Os galhos
sao alternados, e a casca dos novos amarelhada, e
tambem cheia de laa.

Tamanho

He arvore de 1 1/2 palmos de diametro, de tronco
redondo, hum pouco acanellado, e pouco cruscida.

Casca

A casca na superficie he grizea, riscada, e fo-
lhecada verticalmente de modo, que ella he difficil
de se conservar; no interior he mais escura, eija, e
de 2, a 3 linhas de grossura.

Madeira

A madeira he branca grizea suja, pouco eija,
de fibras grossas, e boa de se trabalhar.

Uzo

Nenhum.

Peso especifico 0,826



Felice
egale
Tamara
Casa
Madre
Usa

Embaüba

(Cecropia)

Folhas, *Folia lobata, sinuata, petiolata, digitata*
e galhos Estas folhas são grandes, e estão no fim dos galhos, e o seu talo tem ate 3 palmos de comprimento, de maneira que podem servir-se dellas como chapéo de Sol.

Tamanho He arvore, que não tem mais que hum palmo de diametro, e de tronco alto.

Casca A casca na superficie he quasi lisa, e anellada, de cor branca, ou bruna, e de $\frac{1}{2}$ de linha de grossura; estando verde, he de cor verde no interior.

Madeira A madeira he branca suja, fibrosa, grossa, facil de se cortar, mas difficil de serrar, mui leve, e o cerne he ôco.

Uzo Nenhum para obras; mas serve bem para carvão para polvora. Estando nova sem galhos, fornece huma embira muito tenax. A Prequica se nutre das folhas della.

Preo especifico... o, 4bb... o, 350




Tolh
egam

Tam

Ca

Ma

Ux



Arvore sem nome
(Eugenia)

Folhas,
e galhos

Folia opposita, petiolata, oblonga ovata, integra,
Erigida, margine reflexa.

São lisas de ambos os lados, mas o superior mais es-
curo, que o inferior. Os galhos estão oppositos, e a
casca das novas he branca suja. As folhas novas apa-
recem no mez de Setembro, e são vermelhas.

Tamanho

He arvore de hum palmo de diametro, e de
tronco mal feito, e acanellado.

Casca

A casca na superficie he cor de cinza, e bruna,
Eircada pelo comprimento, lamellera, fina; e no
interior he bruna, de $\frac{1}{4}$ de linha de grossura.

Madeira

A madeira he bruna avermelhada, Eija, fina,
e boa de se trabalhar.


Uxo

Nenhum.

Peso especifico..... 1,134



Foto
e gal
Tama
Co
Ma
U



Folha grossa

Folhas, e galhos	<i>Folia opposita, petiolata, ovata, exigida, integra, margine ceflexa.</i> São lisas de ambos os lados, o superior mais escuro, que o inferior. Os galhos são oppositos, e a casca dos novos bruna.
Tamanho	He arvore de $1\frac{1}{2}$ palmos de diametro, e mal feita.
Casca	A casca na superficie he bruna escura, pouco ciscada pelo comprimento; no interior bruna clara, e de humma linha de grossura.
Madeira	A madeira he vermelha brunada, fija, fina, facha, e serra se facilmente.
Uxo	Nenhum.

Peso especifico..... 1,000




*Tolha
e gal*

Fum

Ca

Ma

Ca



Sagum Eijo
(*Sideroxylon*)

Folhas,
e galhos

Folia alterna, petiolata, oblonge ovata, emar-
ginata, integra.

De ambos os lados são lisas; a parte superior mais
escura, que a inferior. Os galhos alternados, e a
casca delle verde, e brota no mez de Setembro.

Trunko

He arvore de 1 a 2 palmas de diametro, e
mal feita.

Casca

A casca na superficie he bruna clara, mui
laxada, e a camada exterior facilmente se despe-
ga; no interior he cor de canella, e de 6 a 7 linhas
de grossura.

Madeira

A madeira he de cor bruna clara, passando a
cor vermelha, mas as camadas exteriores são mais
claras; he Eijo, fina, e boa de se trabalhar

Uzo

Nenhum.




*Folia
egula*

*Tam
Ca*

Ma

U



Folha de Lagarto

Folhas,
e galhas

*Folia alterna, petiolulata, lanceolata, acumi-
nata, dentata.*

He um lado he mais largo, que o outro, e não den-
tado ao pé do tallo. Os galhas são alternados, e
afinados na ponta; a casca delles bruna escura,
e lisa.

Tamanho

He arvore de dois palmos de diametro.

Casca

A casca he bruna grizea, hum pouco escada,
lamellaria, e fofa; no interior he cor de castanha,
e de 1. ate 2 linhas de grossura.

Madeira

A madeira he branca suja, pouco fija, fina,
e boa de trabalhar-se.

Uzo

Pouco para construcão. A casca da Caiz
fervida em agua he usada contra mordeduras de
cobras; e tambem dizem, que os Lagartos a pro-
curao, quando são mordidos dellas.

Peso especifico 0,928





Carne de Vitella

- Folhas, e galhos* *Folia alterna, subsessilia, lanceolata, dentata, virgida, margine reflexa.*
 Estão as folhas quasi em pé, e as pontas viradas para traz, e as bordas encadadas. Os galhos alternados, e em pé; a casca dellas bruna, esbranquiçada, e lisa.
- Tamanho* He arvore de 1² palmos de diametro, com muitos galhos.
- Casca* A casca he cor de cinza, com muitas, e pequenas excrecencias, e buraquinhos; no interior, estando verde, he vermelha, seca, fica de cor de canella.
- Madeira* A madeira he avermelhada bruna, e encadada atravessadamente; pouco cija, fina, e boa de se trabalhar.
- Uzo* Nenhum.

Peso especifico..... 0,882




*For
ega*

Tam

Ca

Ma

E



Sm Foxe
(*Bombax*)

Folhas,
e galhos

*Folia digitata, foliis ovatis, acuminatis,
pagina inferiori setacea.*

Da parte de cima são de cor verde escura, os cantos
virados para cima. Os tallos comuns são mui
compridos, e oppositos.

Tamanho

He arvore de $1\frac{1}{2}$ palmos de diametro, de
tronco direito, e Cedendo.

Casca

A casca he cor de cinza, aspera, com excrecen-
cias, e de 2 linhas de grossura.

Madeira

A madeira he branca suja, molle, e acha bem,
e direito

Uxo

Nenhum.

Peso especifico 0,521



[Faint handwritten text visible on the adjacent page, including "eg", "Pa", "Me", and "v"]



III° Árvores pequenas
que tem menos de 30 palmas de altura

(N.º 91)

Sassafrax falso, ou Canella Sassafrax

Folhas, Folia alterna, petiolata, ovata, integra, exigida.
e galhos De ambos os lados lisas: a casca dos galhos lúrida.
Tamanho He arvore de 1 palmo de diametro, e bem feita.

Casca Na superficie he bruna escura, finam^{te} Escada,
lamellora, pequena, e com excrescencias; no interior he
amarella, estando verde, mas muda logo a cor ficando
mais escura: de grossura de $1\frac{1}{2}$ linha.

Madeira A madeira he branca grizea, pouco Eija, mas
boa de se trabalhar. Cortando se verde, he ella branca,
mas logo, exposta ao ar, e pelo contacto do ferro, fica
a superficie denegrida, signal de posuir muito
acido galico. Tem muita semelhança com o Sal
safrax, mas he sem cheiro.

Uzo Para obras de construção, exposta ao ar.

Peso especifico. 0,508




*Se
ega*

*Tam
Un*

Ma

U



Folha lisa

Folhas, *Folia opposita, petiolata, ovata, integra.*
e galhos São lisas de ambos os lados, da parte decima de cor mais verde escura; na inferior verde esbranquiçada.

Os galhos novos formão forquilha, e nos fins se achão sempre duas folhas, entre as quaes brotaõ outraviz galhos novos: a casca destes he amarelha clara; a dos mais velhos, mais esbranquiçada.

Tamanho He arvore de meio palmo de diametro.

Casca A casca na superficie he cor de cinza, e lisa; no interior avermelhada bruna, de meia linha de grossura.

Madeira A madeira he branca avermelhada, pouco fija, e fina, mais semelhante a do São de Rato, e boa de se trabalhar.

Uzo Boa madeira de construcão exposta ao ar

Peso especifico..... 1,000



*For
ega*



Marmellada

Folhas, e galhos. *Folia petiolata, opposita, ovata, acuminata*
De ambos os lados hum pouco asperas, e mais luxidias
na parte superior, que na inferior. Os galhos são
oppositos, e a casca dos novos esbranquiçada, e no lu-
gar d'onde cahem as folhas, ficam carunchas gran-
des.

Tamambo

Tamanho He arvore de hum palmo de diametro,
com tronco acanellado.

Casca A casca he bruna na superficie, Eiscada no
seu comprimento, e lamelloira fina; no interior
tambem he bruna, de grossura de $\frac{1}{2}$ linha?

Madeira A madeira he branca brunada, com riscas mais
escuras, Eija, fina, laseosa comprida, e Eacha bem.

Uzo Para construcão não exposta ao ar

Peso especifico..... 1,125





Seiaveira do Campo

Folhas,
e galhos

*Folia petiolata, opposita, obovata, acuminata,
integra, ciliata.*

Hum pouco asperas de ambos os lados; a parte su-
perior verde escura, a inferior verde clara.

Os galhos são oppositos, e de cor bruna.

Tamanho

He arvore, que não chega a ter hum palmo
de diametro, e mal feita. e nasce em terras este-
reis nas vizinhanças dos campos.

Casca

A casca na superficie he bruna avermelhada,
muito lisa, mas secando cacha de todo; cortando se
verde, apparece a pelle exterior de cor verde, e
mais no interior de cor branca suja, de $1\frac{1}{2}$ li-
nha de grossura.

Madeira

A madeira he branca brunada, as camadas
exteriores pouco mais claras, eija, bastante fina,
eija, e trabalha se bem.

Uzo

Madeira de construcão não exposta ao ar, e
muito boa p.^a queimar, por q^d dá hum fogo activo.

Peso especifico. 1,000



Lola
egua

Tanna
Ca...

Ma...

U...



Tureba

Folhas e galhos *Folia petiolata, opposita, lanceolata, acuminata, tomentosa, integra.*

A casca dos galhos novos he bruna, e tambem coberta de cabellos pequenos.

Tamanho *He arvore de hum palmo de diametro.*

Casca *A casca na superficie he cor de cinza, e muito crachada; no interior, estando verde, he vermelha, e desmaia depois; de grossura de 12 linhas: despega-se facilmente da madeira.*

Madeira *A madeira he branca avermelhada, fina, nao muito tija, e boa de se trabalhar.*

Uzo *Serve bem para caibros.*

Peso especifico 0,800




Tol
egat

Tam

Ca

Ma

U



Jambu

Folhas,
e galhos

Folia opposita, petiolata, lanceolata, integra,
cigida, margine ceflexa.

São lisas de ambos os lados, o superior verde escuro, e
luzidio, o inferior baixo. Os galhos são oppositos, e
a casca delles de cor bruna escura.

Tamanho

He arvore de hum palmo de diametro, de tronco
direito, mas acanellado.

Casca

A casca na superficie he bruna grizca, e fina-
mente tachada pelo seu comprimento, e em algumas
partes lamellora; no interior he bruna avermelhada,
e de humna linha de grossura.

Madeira

A madeira he bruna avermelhada, bastante cija,
fina, e boa de se tachar, e serrar.

Uzo

Madeira de construcão; e a fruta he boa para
a criaçao de porcos.




Folke
egathe

Tama
Case

Madison

Ux



Tabiroba

Folhas,
e galhos

*Folia petiolata, opposita, subrotunda, obtuse
acuminata, integra.*

Os galhos novos são também oppositos, e de cor ver-
de avermelhada. Dá humma fruta, que amadu-
rece no mez de Agosto, digo, de Janeiro.

Tamanho

He arvore de hum palmo de diametro.

Casca

A casca he grizea brunada, Cachada, e laminellora,
de grossura so de $\frac{1}{4}$ de linha.

Madeira

He branca avermelhada, fina, Cija, e boa de
traballar-se.

Uzo

Para construcão.

Peso especifico..... 1,000

*Folh
e galh*

Sama

Cas

Mac

U



Larangeira do Mato, ou São Santo

Folhas, e galhos *Folia opposita, petiolata, oblonge ovata, acumini-
minata, pagina superiori lucida, inferiori glauca.*
Os galhos novos são de cor amarella escura, e os tallos
quadrados, com humma impressão na parte superior, e
inferior. Brota no mez de Agosto.

Samamho *He arvore de hum palmo de diametro, e mui
assombrada: nasce em terreno seco.*

Casca *A casca na superficie he bruna clara, e cachada,
no interior, estando verde, de cor vermelha mui viva,
secando, fica de cor de canella, de 2 linhas de grossura.*

Madeira *A madeira he cor de Coza de maisada, eija, las-
cora, fina, e difficil de se rachar.*

Uzo *Muito boa para obras de Marcinaria. A
casca tinge sem mordente de cor de Coza; e com pedra
humme dá humma cor bruna*

Peso especifico..... 0,719




Folth
egalh
Tame

Car

Ma

Ux



Unha de Bô

Folhas, e galhos. *Folia bilobata, novem nervia petiolata, alternata.*
Os galhos são alternados.

Tamanho. He arvore de hum palmo de diametro: o tronco não he bem cedendo, mas algum tanto torcido.

Casca. A casca he bruna escura na superficie, e alguma coisa rachada; no interior bruna clara, e apenas de huminha de grossura.

Madeira. A madeira he branca brunada, com cerne bruno; eija, fina, e racha bem. Tem o seu nome da figura das folhas, que parecem unha de bô.

Uzo. Para obras de marcenaria

Peso especifico..... 1,015



*For
cga*

San

Ca

Ma

U

N^o 100



Jacarandá pequeno, ou da beirada do Campo

Folhas, e galhos *Folia pari pinata, foliolis petiolatis, linearibus, emarginatis, integris*

De ambos os lados são lisas, no decima, de cor verde escura, no inferior, verde clara. Em parte estão opostas, em parte não. Os tallos comuns contem de 6 a 14 pares de folhas. Os galhos tem a casca esbranquiçada, e fuscada pelo seu comprimento.

Tamanho He arvore de hum palmo de diametro, e não muito bem feita.

Casca A casca na superficie he grizca avermelhada, mui fuscada, e hum pouco fuscada no comprimento; no interior he bruna avermelhada, e em algumas partes de mais de hum polegada de grossura.

Madura A madura he branca amarelhada, mui fija, e dura a serrar, fina, e facha bem.

Uzo Serve principalmente para cangas de boy

Peso especifico. . . . 1,133.



Fol
e gal

Tam

Ca

Mad

Uz

8101



Coronha de Espingarda

Folhas,
e galhos

Folia opposita, petiolata, oblonge ovata, acumina-
= nata, integra, margine reflexa.

São lisas de ambos os lados; os galhos oppositos, e
a casca dellas cor de cinza, e lúrida.

Tamanho

He arvore de hum palmo de diametro, com
muitos galhos.

Casca

A casca na superficie he cor de cinza, desigual,
hum pouco lamellosa; no interior branca, e de $1\frac{1}{2}$
linha de grossura.

Madeira

A madeira he branca, sem cerne, bastante
fina, pouco dura, cacha bem, mas he difficil de
se serrar, e de resto he boa de se trabalhar.

Uzo

Para Coronhas de Espingardas, e coltheres.

Peso especifico..... 1,081.




Tol
ega

Tam
Ca

Ma

U



Fruta de Tocano.

Folhas,
e galhos

Folia alterna, petiolata, oblonge ovata,
acuminata, serrate aculeata.

A parte superior he lisa, e luxidia, a inferior
amarellada com nervos fortes, e cobertos de ca-
bellinhos. Os galhos são alternados, e a casca
delles cor de cinza.

Tamanho

He arvore de hum palmo de diametro.

Casca

A casca na superficie he cor de cinza; Eija, e
desigual; no interior he bruna, de 2 linhas de
grosura.

Madeira

A madeira he branca com annis Escados;
não he muito fina, bastantemente molle; fa-
cil dese Escachar, mas difficil de serrar. Tem
o seu nome, por ser a fruta muito procurada
pelos Tocanos.

Uzo

Serve hum para Emos de Canoas; fora d'isto
pouco uzo fazem della

Preo especifico. o, 750





Beira do Campo

Folhas, e galhos. *Folia petiolata, oblonga, obovata, alternata.*
A parte de cima he aspera, e verde escura; a de baixo tem nervos fortes, e cobertos de pequenas cabellinhos, e a margem contem pequenos espinhos.

Tamanho He arvore de campo, de hum palmo de diametro, e que nasce em terrenos cileril na beira do campo.

Casca A casca he bruna, mui fofa, e Cachada como o Oleo em pequenos quadrados; no interior tambem he bruna, e de 2 linhas de grossura.

Madeira A madeira he bruna e branqueada, bastante mente fina, Cacha bem, mas he difficil de trabalhar se.

Uzo Servem se da madeira para chumassos nos carris, por fazer maior fricção para cantar melhor o carro.

Peso especifico 0,700




Sci
equ

Sam
Co

Ma

U

N 104



Vermelhaço

- Folhas e galhos** Folias alterna, petiolata, obovata, emarginata, margine dentata, flexa, rigida. De ambos os lados são lisas. Os galhos alternados, e a casca esbranquiçada. Produz huma fruta vermelha, de que toda a arvore fica coberta.
- Tamanho** He arvore de campo, de hum palmo de diametro.
- Casca** A casca na superficie he cor de cinza, bastantemente lisa, e com anneis profundos; no interior, estando verde, he vermelha bruna, secando, fica bruna, de 4 a 5 linhas de grossura.
- Madeira** A madeira he branca avermelhada, pouco fina, tracha bem, e he facil de se serrar.
- Uzo** Serve tambem para chumafos; e a cinza da madeira he mui boa para barrella, e para sabão. A fruta pinada com agua da huma tinta, com que os Selleiros tingem os couros de vermelho.

Peso especifico 1,000



Feth
egat

Tam
Cia

Ma

U



Angelim-merim

Folhas,
e galhos

Folia impari pinnata, foliolis subsessilibus,
clipticis, acuminatis, integris.

Na parte superior são lisas, e de cor verde escura, na inferior bassas, e com cabellos finos. Os talos communs estão oppostos, e a casca dos galhos novos he branca, amarellada, e luzidia.

Tamanho

He arvore de hum palmo de diametro.

Casca

A casca na superficie he grizea, bruna, lamellosa, fina, e Circada atravessadamente aqui, e acolá; no interior he bruna amarellada; e de huma linha de grossura.

Madeira

A madeira he inteiramente branca, não muito tija, e tambem não boa de se trabalhar.

Uzo

A fruta, assim como a casca da Caix fervida em agua he bom remedio contra as lombrigas.

Peso especifico 0,923




*For
ego*

*Tan
b*

M

u



Congonha verdadeira

Folhas,
e galhos

Folia petiolata, opposita, oblonge ovata, acuminata,
vigida, dentata.

A parte superior he verde escura, luxidia; a infe-
rior verde clara, e bassa. Os galhos sao alternados,
e a casca delles bruna clara.

Tamanho

He arvore de campo, de hum palmo de diametro

Casca

A casca na superficie he bruna grizea, pouco
cachada, e com excrescencias, eija; no interior he
bruna escura, de 4 a 5 linhas de grossura.

Madeira

A madeira he branca suja, e toma superficial-
mente huma cor verdeonga; tem fibras grossas,
he molle, eacha bem, he ma' de se serrar, mas
boa de se trabalhar.

Uzo.

Da madeira nao fazem uzo algum; mas as
folhas torradas dao hum cha' excellente, que tam-
bem he conhecido com o nome de Mate.

Peso especifico 0,764




Fol
ega

Tam
Ca

Ma

U



Arvore sem nome

Folhas, e galhos *Folia petiolata, opposita, oblonge ovata, crenulata.*

De ambos os lados são lisas: Os galhos oppositos, e a sua casca bruna, e com fendas. Florece em Agosto.

Tamanho *He arvore de hum palmo de diametro.*


Casca *A casca he malhada bruna, e grizea, pouco lachada, não muito fenda; e no interior branca, e de hum linha de grossura.*

Madeira *A madeira he mui branca, fina, fenda, boa de se lachar, e trabalhar.*

Uzo *Nenhum.*

Peso especifico. 0,772





Casca branca

Folhas, *Folia opposita, pinnata, foliolis oppositis, ovate*
egalthas lanceolatis, trinerviis, integra.

De ambos os lados são lisas. O tallo commun no seu
pé tem duas folhas quasi redondas, e incisas na ponta.
Os galhos são oppositos, e a casca destes de cor bruna,
com rugas finas.

Tamanho He arvore de hum palmo de diametro, e mal feita.

Casca A casca he bruna grizca, fina, lamellora, e mu-
fôfa; no interior, estando verde, he ondiada de branco,
e amarello, secando, desmaia hum pouco; e tem de
grossura $1\frac{1}{2}$ linhas.

Madeira A madeira he branca suja, com poucas Escas m-
e curas, não muito Eija, nem fina, mas boa de
se trabalhar.

Uzo Nenhum.

Peso especifico.....0,900





Arvore sem nome.

Folhas, *Folia petiolata, opposita, oblonge ovata, obtuse*
egalthas *acuminata, margine integra, undulata.*
Ambos os lados são lisos, o superior mais escuro, do
que o inferior. Os galhos novos oppositos, e a sua
casca branca suja.

Tamanho *He arvore de hum palmo de diametro.*

Casca *A casca na superficie he grizca, lamellora, fina,*
e pouco lachada; no interior, estando verde, bruna
clara, e secando mais escura, e de 1 a 2 linhas de
grossura.

Madeira *A madeira he branca suja, bastantemente*
fina; lacha, e trabalha se bem.

Uzo *Nenhum.*

Peso especifico.....0,842

B



B

*Arvores, que perdem as
suas folhas, e que estão som.^{te} verdes no Verão.*

B

*Arvores, que perdem as
suas folhas, e que estão som.^{te} verdes no Verão.*

B

[Faint, illegible handwriting]



*To
eg*

*Jan
C
M*



1.º *Arvores grandes,*
que perdem as suas folhas, e que estão
sòmente verdes no tempo do Verão.

Xipé-merim

Folhas, *Folia opposita, quinata, foliolis ovatis, acumi-*
e galhos. *natis, dentatis.*

Os tallos são oppositos, e muito compridos. Os tallos
comuns tem na parte superior huma incisão profun-
da, com q se distinguem das folhas do Barreguão.

A casca dos galhos novos he verde. As folhas sahem
mais tarde, que as flores, que apparecem no mez de
Agosto, e pela sua cor amarella fazem distinguir
de longe esta arvore.

Tamanho He arvore de 1½ palmos de diametro, com
pequena corôa.

Casca He grizca branca, e de 11 linhas de grossura.

Madeira A madeira he branca amarelhada com cerne de
cor verde suja; he cija, fina, lãscora fina, e cacha bem.
Crece muito de vagar, como mostram as suas linhas.

linhas circumferenciaes.

Uzo

He huma das melhores Madeiras para todas
as Obras. A cana tinge de vermelho, e com a
serragem fervida em agua se matao' pióthos.

Peso especifico. 0,869.



para todas
com a
hoi.

Cedro vermelho

Folhas,
e galhos

Folia pari pinnata, foliolis subsessilibus,
lanceolatis.

As folhas chegam a ter o comprimento de $1\frac{1}{2}$ até 2
palmos, e estão à Eoda dos galhos formando huma
specie de cabeça. Dá semente no mez de Agosto,
e no de Setembro novas folhas.

Tamanho

He arvore de 3 a 4 palmos de diametro.

Casca

A casca he de cor de canella, e com Eachas pro-
fundas; no interior he mais clara, e de grossura
de $1\frac{1}{2}$ polegadas.

Madeira

A madeira he branca amarelhada, e o cerne
bruno avermelhado; não muito Eija, lencosa, fina,
Eacha bem, e tem hum cheiro agradavel.

Uzo

Huma das principaes madeiras para obras de
construção, e de marcinaria, e para escultura, e canoas.

Peso especifico 0,745.

(111)

[Faint, illegible handwriting]



*Fo
ega
San*

U



Cedro branco, ou femer.

Folhas, *Folia impari pinnata, foliolis sessilibus,*
e galhois *alternis, lanceolatis ovatis.*

Tamanho *He arvore de 3, a 4 palmos de diametro, que*
se distingue do Cedro vermelho só pela madeira,
que he branca, e com hum cerne muito pequeno
avermelhado.

Uzo *Cinzenno que e anterior*

Peso especifico. 0,807.



Folh
e galh

Tama

Case

Made

Ux

Aroeira

Folhas, e galhos Não vem a descripção das folhas, por estar esta arvore sem ellas, durante o tempo, em que se fez a collecção das madeiras, que era nos mezes de Julho, Agosto, e Setembro.

Tamanko He arvore, que chega a humma grossura de 15 palmos; de tronco direito, e que se propaga por estacas.

Casca A casca na superficie he cor de cinza, e por baixo immediatamente da superficie quasi de cor bruna negra; muito fachaada pelo seu comprimento em pedacos irregulares, mui fija, e quasi de humma polegada de grossura.

Madeira As camadas exteriores são brancas, o cernie de cor bruna avermelhada, extremamente fija, fina, facha direito, e bem.

Uzo He de todas as madeiras a que se conserva eternamente, assim no chão como no ar; para esteios de pontes, e para Caxas, assim como também para obras de marcinaria.

Peso especifico. 1,252



De
eg
San
E
M
g



Jacarandatan

Folhas, *Folia impari pinnata, foliolis ovato lanceolatis,*
egalthos. *acuminatis.*

O tallo commun contem 13 a 14 pares de fo-
lhas oppositas. Os galhos são alternados, e brotao
novos no fim de Agosto, e principio de Setembro.

Tamanho He arvore de 3 a 5 palmos de diametro, de
tronco muito alto, pouco eidoendo, e em cima ordi-
nariamente alguma coiza torto, e com poucos galhos.

Casca A superficie della he grizca, mui fofa, e Escal-
da; no interior, estando verde, he branca averme-
lhada, e emana della hum sumo cor de sangue;
de grossura de hum polegada.

Madeira A madeira he mui fija, e hum das melhores do
Brazil; o cerne he cor de castanha, e as camadas exteri-
ores de cor branca amarelhada; he laseira, direita, mas
cacha difficilmente. Estando verde, he a serragem della
amarella suja, mas muda logo a cor, ficando bruna.

Uzo Para todas as Obras de construcão, e de marcinaria,
e principalmente para Carros.



De
eg
San
la
Na
l

Jacaranda vermelho

Folhas,
e galhos

São mesmo como as de Jacaranda-tan.

Tamanho

He arvore de 2 a 3 palmos de diametro, e não muito bem feita.

Casca.

A casca tambem não differê da do Jacaranda-tan; mas não he tão grossa, e lança de si sumo vermelho.

Madeira

As camadas exteriores são de cor branca suja; o cerne bruno avermelhado com flocos mais escuras; e he humas das mais lindas madeiras, muito fina, e boa de se trabalhar.

Uzo

Principalmente para móveis de Casas.

Peso especifico.....0,950




Tetha
egatha

Tamann

Carca

Madu

Uzo



Balsamo

Folhas,
e galhos

Folia pari pinnata, foliolis lanceolatis, emarginatis, integra.

As folhas novas apparecem no mez de Agosto, e tanto ellas, como os galhos são alternados.

Tamanho

He humma das maiores arvores do Brazil, cujo tronco chega a altura de 120 palmos, e de grossura até de 8 palmos, e muyto diruto.

Casca

A casca he na superficie branca verdoenga, semeada de pequenas excrescencias; no interior he amarello brunada, de 1 $\frac{1}{2}$ linhas de grossura.

Madeira

As camadas exteriores são bem brancas, o cerne bruno avermelhado penetrado com ficas mais claras; facha diruto, mas difficilmente, lascosa, fina, e tenax.

Uzo

Humma das principaes madeiras de construcão, e de marcinaria, que tem o seu nome do sumo balsamico, que emana da casca, e que he usado na Medicina. Os animaes, como Macacos, Viados, e Porcos goitao m^{to} deste sumo, e p^{to} isso cõem a casca da árvore.

Sero especifico 989



*For
e ga*

Tam

Ca

Ma

u



Paroba vermelha

Folhas,
e galhos

Folia alterna, petiolata, oblonga, margine sinuata,
integra.

São brancas de ambos os lados, do superior mais escuras, eluzidias, que do inferior. Os galhos são alternados, e a casca dos novos verde com excrecencias brancas.

Tamanho

He arvore de 4 a 5 palmos de diametro, com tronco bem feito.

Casca

A casca he na superficie grizea amarelhada; no interior cor de Coza, e de grossura de 2 linhas.

Madeira

A madeira, estando verde, he branca, com cerne de cor de aurora; mas desmaia depois, e o branco toma hum cor de Coza fina.


Uzo

He hum das melhores madeiras de construcão, e Marcinaria.

Peso especifico. 1,000



Sol
ega
Tam
Ca
Ma
U



Paroba branca

- Folhas,* *Folia alterna, petiolata, ovata, acuminata.*
egalthos *A casca dos galhos novos he lisa, e verde.*
- Tamanho* *He arvore de 3 palmos de diametro, que differ pouco da anterior.*
- Casca* *A casca he na superficie de cor grizea amarelada, e achada no comprimento, e de quasi hum polegada de grossura.*
- Madeira* *A madeira he branca amarelada com poucas riscas cor de coxa; lencora, fina, e acha direito, e bem.*
- Uzo* *Para todas as obras de construcão, e marcenaria, mas não na terra, e ao Sol facilmente echa*

Peso especifico 0,920

Small

Handwritten text, possibly a signature or name, in cursive script.

To the
e gal
Tama
Car

Mad

Ux



Sequetiba branco

Folhas, Não se deterioram as folhas, por estar a ar-
e galhos voro sem ellas ao tempo em que se fez esta
collecção.

Tamanho He arvore de 2 a 3 palmos de diametro.

Carca A carca na superficie he bruna negra, e achada
em todas as direcções, e fija; no interior, estando
verde, he amarella suja; secando, amarella bruna,
de 2 a 3 linhas de grossura.

Madeira A madeira he branca suja, não muito fina,
facil de echar, e boa de se trabalhar. He cara
no Sirtao do Abacthe.

Uzo Para obras de construcção, e para cernos.
A embira da carca he muito boa para calafetar
navios.

Peso especifico..... 0,809

WV

Requiescat in pace





Jacaré

Folhas,
egaltos

Folia petiolata, ovata, integra.

Tamanho

He arvore de dois palmos de diametro, de tronco bem direito.

Casca

A casca na superficie he cor de cinza, e bruna, mui Cachada por todos os lados, lascada, escamosa: no interior he bruna amarelada, e de 1/2 linhas de grossura.

Madeira

As camadas exteriores da madeira são de cor branca amarelada; as interiores bruna amarelada, pouco Cija, pouco fina, e má de se trabalhar.


Uxo

Boa madeira de construcão para o chão. Tem o seu nome pela semelhança, que tem a casca com as escamas do Jacaré.

Peso especifico.....1,000



For
eg
Tan
Ca
Ma
W



Amoreira

Folhas,
e galhos

Folia petiolata, alterna, oblonge ovata, serrata,
acuminata.

São lisas de ambos os lados, o superior de cor verde m^{to} escura, o inferior mais clara. Certos insectos costumam deitar nellas seus ovos. Os galhos alternados, e a casca dos novos cor de cinza: os de hum anno estão armados de espinhos, q' sahem dos angulos das folhas.

Tamanho He arvore de 2 a 3 palmos de diametro, e de tronco bem futo.

Casca

A casca na superficie he lisa, e branca cor de prata; no interior a primeira pellicula he verde, e o tecto branco amarelado, de 2 a 3 linhas de grossura. Offendendo-se a casca, lanca em grande quantidade hum succo grosso adocado, de cor de leite.

Madeira

As camadas exteriores são de cor branca amarelada, o cerne cor de enxofre muito vivo; não he muito fina, eacha bem, he tizerada, e mui tija.

Uzo

Humia das melhores madeiras de construcão no chao, e no ar. O cerne tingido de cor de enxofre.

Testo especifico o, 869




Sol
eg

Tam
Ca

Ma

U



Canudo, ou Guatambu

Folhas,
e galhos

*Folia alterna, petiolata, ovate oblonga,
margine undulata.*

O lado superior he luxidioso, o inferior baixo com ner-
sos grossos, e cabelludos. Os galhos não são oppositos,
e brotao no mez de Agosto.

Tamanho

He arvore de 2 a 3 palmos de diametro.

Casca

A casca he branca brunada, lamellonaria, e com fugas
na superficie; de 2 linhas de grossura.

Madeira

A madeira he amarella esbranquiçada, laseosa,
fina, e achá diruto, mas difficilmente.

Uzo

Para construcão, e marcinaria. As arvores novas
servem para canudo de Cachimbo, e daqui o seu nome.

Peso especifico. 1,000

*For
ega
Tam
Ca*

Ma

U

Folha larga, ou Folha de Bolo

Folhas. Não se descrevem as folhas, por não as haver e galhos nesta Arvore, quando se fez a Collecção.

Tamanho. He huma das mais altas, e grossas arvores.

Casca. A casca na superficie he cor de cinza, e aspera; no interior estando verde, he branca amarelhada, e lanca, sendo ferida, hum sumo cor de sangue, como na Embira de Carisso, porém mais lentamente, e em gotas mais grossas; secando, he de cor branca suja, de 4 a 6 linhas de grossura.

Madeira. As camadas exteriores da madeira são de cor branca suja, e o seu cerne encorpado de cor vermelha bruna, e de umaia facilmente ao ar; não he muito fina, mas boa de se trabalhar.

Uzo. Huma das principaes madeiras de construcção para obras hydraulicas.

Peso especifico..... 0,875



For
egat
Tama
Ca
Ma
U



Óleo de Copahiba, ou branco

Folhas,
e galhas

Folia pari pinnata, quatrijuga, foliolis subversiliis, ovalis.

No tallo comm'estão ordinariamente 4 pares.

Os galhos são cheios de folhas, que brotao em Agosto.

Tronco

He arvore de 4 palmos de diametro, com tronco bem direito.

Casca

A casca na superficie he de cor bruna denegrida, e Cachada em pequenos quadrados, que facilmente se despegao; debaixo desta superficie he a casca vermelha bruna, e mais no interior grizea, e ao todo de 3 linhas de grossura.

Madeira

A madeira he branca suja, eija, não muito fina, eacha direito, mas difficilmente.

Uzo

Bom madeira de construção. Furando-se o paio ate quasi ao meio, sahe delle o Óleo conhecido na Pharmacia debaixo do nome de Óleo de Copahiba.

Peso especifico 0,855



F
eg
Tan
C
M
V

Oleo vermelho

Folhas, e galhos	Corno as do Oleo de Copahiba
Tamanho	O tronco muito alto, com corôa pequena.
Casca	Corno a do anterior
Madeira	A madeira he mais escura pelo interior, e on- deada de cor bruna amarelhada.
Uxo	Principalmente para corunhas de Espingardas, e não da o Oleo, como a anterior

Peso específico. 0,698



To
eg
Tam
Ca
Ma
A

Cangerana

- Folhas, e galhos *Folia impari pinnata, foliolis petiolatis, alternis, ellipticis, acuminatis, integris.*
As folhas novas são cabelludas.
- Tamanho *He arvore de 4 palmos de diametro, e nas muito bem feita.*
- Carca *A casca na superficie he de cor grizea, e Eacha da finamente pelo comprimento, e annellada com anneis que são ate de 3 linhas de grossura; logo por baixo da superficie he a carca cor de sangue, e no interior bruna clara.*
- Madeira *As camadas exteriores da madeira são amareladas, as interiores cor de Coza escura; de mais depois, esse assemelha entao muito ao Cedro vermelho. He molle, Eacha bem, e direito.*
- Uzo *Boa madeira de construcão, e de marcinaria.*

Peso especifico..... 0,532



Fo
ega
Tam
Ca
Ma
U



Pintaibuna

Folhas,
e galhos

*Folia alterna, petiolata, oblonge ovata, acuminata,
crispa margine.*

Apparecem no mez de Agosto as folhas novas.

Tamanho

*He arvore de 2 palmos de diametro, de tronco
direito, e cedondo, com coroa pequena.*

Casca

*Na superficie he cor de cinza com muitas fugas,
no interior de cor bruna clara, e de 3 linhas de grossura.*

Madeira

*A madeira he branca amarelhada, eija fina, eacha
direito, mas difficilmente.*

Uxo

Serve para obras de construcão, e de marcenaria

Peso especifico 0,960


*De
eg*

*San
t*

Ma

2





Taia pupuia, ou Vinhatico pupuia

Folhas. Folia alterna, petiolata oblonge ovata, integra.
egalthos A parte superior he mais escura, que a inferior,
 e ambos os lados, assim como o tallo, e os galhos novos,
 finamente cabelludos. Os galhos estao alternados, e
 a casca he bruna

Tamanho He arvore de 2 a 3 palmos de diametro.

Casca A casca na superficie he bastantemente lisa, com
 pequenas, e atravessadas rachas, de cor de cinza, e
 bruna; no interior he amarella brunada, e de hum
 linha de gromura.

Madeira A madeira he amarella brunada, com cerne
 mais carregado, não muito fijo, fina, e boa de se-
 tralhar.

Uzo Boa madeira de construcão, e para canoas.

Peso especifico 1,000

Do
ega

Tan

Co

Ma

U



Paio de Cobra

Folhas, *Folia bipinnata, foliolis oppositis, salabiformibus*
e galhos As folhas são alternadas, e impares, com hum na
 ponta, até 30 pares n'hum tallo commun. Os ga-
 lhos também são alternados, e a casca dos mais novos
 verde, e coberta de cabellos amarellos. Brotão no mez
 de Outubro.

Tamanho He das mais altas arvores, de 2 palmos de di-
 ametro, tronco bedondo, e direito. Tem muita seme-
 lhança com o Espinheiro.

Casca A casca he aspera com pequenas excrescencias, pin-
 tada de manchas brancas, e brunas; no interior, estan-
 do verde, he branca, secando, fica de hum amarello su-
 jo; de 2, a 3 linhas de grossura.

Madeira As camadas exteriores da madeira são brancas;
 o cerne tingido de vermelho e bruno; bastantem'ija,
 boa de serrar, mas difficil de trabalhar-se.

Uzo Boa madeira de construcão; e a casca da caiz he
 bom remedio contra a mordedura de cobra, d'onde o
 seu nome.

Peso especifico. 1,250



For
e ga
Tame
Can
Ma
U



São Tombo

- Folhas, e galhos *Folia impari pinnata.*
- Tamanho *He arvore de 2 $\frac{1}{2}$ palmos de diametro.*
- Casca *A casca he de cor bruna escura, Eachada, e de 2 linhas de grossura.*
- Madeira *A madeira he branca avermelhada, de fibras grossas, laseosa, lorta, e mui tenaz.*
- Uzo *Pertence as madeiras boas de construcão.*

Sero especifico. 0,615.




*For
e ga*

Tam

Ca

Ma

U



Barreguido de espinho

(Bombax)

Folhas. Folia alterna, petiolata, quinata, foliolis subovatis, e galhos dentatis

Os galhos novos são verdes, cheios de folhas, e alternados: brotao no mez de Agosto.

Tamanho He arvore de quasi 16 palmas de diametro, e maior ainda estando em terreno bom. N'hum altura de 16 palmas, mais, ou menos, sobre o chao, he o seu diametro maior, de modo que faz hum grande barriga, d'onde vem o seu nome.

Casca A superficie da casca he grizea, e cheia de espinhos piramidais, que estao inclinados com a ponta para baixo; o interior vermelho, e de 1 1/2 polegada de grossura.

Madeira A madeira he branca, e muito mole; estando verde muí aquosa, e facil de se cortar, de modo que hum pessoa em 10 minutos corta hum arvore de 16 palmas de diametro.

Uzo Serve p^a gamellas, e obras de circultura, mas he de pouca duracao. Tem hum lã, ou paina, q^a serve p^a encher travesseiros de camas. *Uso especifico*



Sol
egat
Tama
Car
Acad
Ux



Azeito Cavallo branco

Folhas e galhos Folia alterna, petiolata, ovata, acuminata, dentata, biguda, trinervia, pagina inferiori glauca. Os galhos são alternados; e no mez de Agosto tem fructas maduras sem ter folhas.

Tamanho He arvore de 3 palmos de diametro, e ordinariamente torta.

Casca A superficie he cor de cinza com pequenas excrescencias; e interior vermelho bruno, e de $1\frac{1}{2}$ polegada de grossura.


Madeira A madeira he bruna clara, pouco biga, lãscosa, direita, e lãcha bem.

Uzo Para gamellas, e obras de escultura. A cinza he muito boa para luxivia de sabão, e tambem p^a tirar os cabellos dos couros.

Peso especifico. 0,5110



Fo
eg
San
Co
Ma
U



Gamelleira

Folhas, e galhos *Folia petiolata, oblonge ovata, obtusa cum acumine, acuminata, deflexa, integra*

Brotao no mez de Agosto, assim como os galhos.

Tamanho *He arvore de 12 palmos de diametro, direita, e na sua base forma varios salientes, como Cernos de barcos.*

Casca *A casca na superficie he cor de cinza, e pouco lachada pelo comprimento; no interior he branca amarelhada, e de 2 linhas de grossura, estando verde, e em se cortando, da de si hum sumo pegajoso de cor de leite.*

Madeira *A madeira he branca, secando, fica amarelhada, molle, laseira, direita, e lacha bem.*

Uzo *Principalmente para gamellas, e outras obras de escultura. Da hum a cinza superior para sabao.*

Peso especifico 0,608

1845

John Brown

My dear Sir,
I have the pleasure to inform you that
the committee of the Massachusetts
Society for the Abolition of Slavery
have received your letter of the 10th inst.
and are much gratified by the interest
which you have taken in our cause.

I am sure that your efforts
will be successful in securing
the abolition of this evil.
I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. B. Brown




I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. B. Brown
P.S. I have the pleasure to inform you
that the committee of the Massachusetts
Society for the Abolition of Slavery
have received your letter of the 10th inst.
and are much gratified by the interest
which you have taken in our cause.

Embira-açu
(Bombax)

- Folhas, e galhos. *Folia petiolata, digitata*
Os tallos communs são de varios palmos de comprimento. Os galhos são obtusos na ponta, e tem a configuração de Rizes de Viados.
- Tamanho. He humna das mais altas, e grossas Arvores, de 6 a 8 palmos de diametro.
- Carca. Na superficie he grizca, e mui Cachada pelo comprimento com alto, e baixos; no interior, estando verde, he bruna avermelhada com veias brancas, secando, fica cor de castanha, e as camadas exteriores, que são mui fijs, de cor bruna avermelhada.
- Madeira. A madeira he branca brunada, molle, bastante mente fina, boa de se trabalhar, porém má de se serrar.
- Uzo. Não tem outro uzo, se não para gamellas, e estas mesmas apodrecem facilmente. Estando o pão novo, dá humna boa embira.





Formigueiro, Pão de Formiga, ou Farinheiro

Folhas, e galhos *Folia opposita, sessilia, oblonge ovata, acuminata, integra.*

Os galhos são oppositos, e brotao no fim de Agosto, ou principio de Setembro.

Tamanho *He arvore de 3 palmos de diametro, de tronco redondo, e alto.*

Carca *A carca he grizca brunada, lamellora, e grosseiramente cachada, de 4 linhas de grossura.*

Madeira *A madeira he branca amarelhada, eija, tenax, lascosa, torta, e grossa, fibrosa, comprida, e difficil de se cachar.*

Uzo *Nenhum, por ser logo coida pela braca, e endurecida a pi, ou farinha, d'onde o seu nome.*



For
e ga
Tam
Ca
Ma
U

II.° Árvores de media altura



N.º 136

Cambota, ou Cambota, e tambem Caixa d'Anta

Folhas, e galhos. *Folia pari pinnata, foliolis lanceolatis, obtuse acuminatis.*

Estão 2, ou 3 paros de folhas n'hum talo comum.
Florece no mez de Agosto.

Tamanho *He arvore de 1½ palmos de diametro, e de tronco não cedendo, formando canellas semelhantes ás costas de huma Anta.*

Carca *Na superficie he esbranquiçada, e cheia de pequenas excrecencias; no interior bruna.*

Madeira *He amarella avermelhada, eija, mui tenaz, e difficil de se eachar.*

Uzo *Não fazem uso della, por ser difficil de se trabalhar.*

Peso especifico..... 0,895





Taboca

Folhas Não se descrevem as folhas, por estar a Arvore e galhos sem ellas, quando se fez a Collecção.

Florece no mez de Agosto, sem ter folhas.

Tamanho He arvore de $1\frac{1}{2}$ palmos de diametro, e mal feita.


Casca A casca he de cor branca brunada, grosseiríssima. Cachada, e como cortica; de mais de $\frac{1}{2}$ polegada de grossura.

Madeira A madeira he branca suja, laseca, fina, e direita; Cacha bem, e parece crescer mui vagarosa.

Uzo Serve principalmente para Niollas, Rebecas, coronhas de espingarda, e coizas semelhantes.

Peso especifico. 0,666





Mulher pobre

Folhas,
e galhos

*Folia bipinnata, foliolis alternis, lanceolatis,
dentatis*

Na extremidade de cada dente tem hum pequeno
espinho. No mez de Agosto ainda conserva as fo-
lhas velhas, que cahem todas, e em Setembro bro-
tao as novas.

Tamanho

He arvore de $2\frac{1}{2}$ palmos de diametro, e nao
muito bem lançada.

Carca

Na superficie he a carca de cor grizea, e muito
desigual; no interior cor de Coza suja, mas fica
logo bruna; de 4 linhas de grossura.

Madeira

A madeira he branca, bastantemente fina, pou-
co dura, e cacha difficilmente.

Uzo

A cinza da madeira serve para sabao, e para
tirar os cabellos dos couros.

Peso especifico..... 0,722




*St
eg*

*Tam
Ca*

Ma

U



Accia-Cavallo vermelho

Folhas, *Folia opposita, petiolata, ternata, foliolis petiolatis e galhos. ovate lanceolatis, irregulariter dentatis.*

Da parte superior são lisas, e mais escuras, da inferior mais claras, e finamente cabelludas. Os tallos comuns são oppositos, e também cobertos de cabellos finos.

A casca dos galhos novos he verde, e os galhos são ovados, e não arredondos, e formão angulo recto hum com outro.

Tamanho He arvore de 1 palmo de diametro, e mal feita.

Casca Na superficie he bruna grizua, e grossa^{te}. E achada pelo comprim^{to}; por baixo da superficie he bruna com flocos longitudinaes brancas, e finas; o interior, estando verde, he vermelho bruno, e de 2 linhas de grossura.

Madeira A madeira logo por baixo da casca he de cor branca avermelhada, mas para a ser de cor vermelha bruna clara no interior; he molle, e boa de se trabalhar.

Uzo A casca tinge de cor bruna, assim como a madeira, que dá hum cor mais clara. A madeira serve para arcos de Sellas, e Langalhas





Sete-casacas, ou Sete-capotes

Folhas, *Folia petiolata, opposita, ovata.*
e galhos

Tamanho He arvore de 1 ate 1 $\frac{1}{2}$ palmos de diametro; muito mal feita, o tronco torto, e mui acanellado.

Carca A carca he cor de canella, e se divide toda em lamellas, ou folhas muito finas, podendo se contar ate 50 differentes camadas. Nas arvores selhas ella se despega facilmente, e apresenta humna prospecto esfarrapado.

Madeira A madeira he humna avermelhada clara, Eija, fina, liscosa, torta, eacha mal, e he difficil de se trabalhar.

Uzo Produz humna fruta boa, que se come; da madeira nao fazem uzo algum; e tem o nome, da divisao das carcas.

Peso especifico..... 0,939




To
ega

Tam
Co

Mo

U



Urtiga, ou Cansansan

Folhas, As folhas tem a mesma configuração das da Urtiga, mas são muito maiores, e tocando-se, causão hum dor ardente.

Tamanho He arvore de $1\frac{1}{2}$ palmos de diametro.

Carca A carca he na superficie cor de cinza, lamellora, e pouco Cachada pelo comprimento, e tem hum lustre arsetinado; no interior he branca suja, e de humma linha de grossura.

Madeira A madeira he branca suja, muito molle, de sorte que facilmente se pode penetrar com hum instrumento; tem hum miollo no meio, e todas as camadas, ou annos estao quasi soltos em camadas humas sobre as outras. Cachase bem.

Uzo Nenhum.

Handwritten text, possibly a title or heading, appearing as a dark, smudged mark.

Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Partial view of handwritten text on the adjacent page, including words like "Soc", "ega", "Tam", "Can", "Mad", and "Us".



Pão d'agua

Folhas. *Folia* alterna, petiolata, cuneiformia, integra e galhos De ambos os lados são lisas, e de humma substancia muito fina. Os galhos são alternados.

Tamanho He arvore de $1\frac{1}{2}$ palmos de diametro, e muito mal feita, a qual cresce nas ribanceiras do Rio Abacathé.

Casca Na superficie he a casca de cor bruna amarellada, e aspera; no interior branca amarellada de 1 linha de grossura.

Madeira A madeira he branca, com hum cerne cor de castanha; mui fiza, fina, e má de se trabalhar.

Uzo Nenhum, provavelmente por não ser conhecida.

Peso especifico..... 1,000





III^o Arvores pequenas

Angelica

Folhas, *Folia opposita, petiolata, ovata, acuminata, integra e galhoi* A parte superior he mais escura, que a inferior, e com nervos grossos. Os tallos são compridos, e oppositos; os galhoi também são oppositos, e a casca delles cor de cinza, e lisa.

Tamanho He arvore de 1 até 1 $\frac{1}{2}$ palmos de diametro, que se acha nas beiradas do campo.

Casca Na superficie he cor de cinza escura, m^{te} aspera, e trincada atravessadam^{te}; no interior he cor de canella, secando, desmaia mais, e de 2 a 3 linhas de grossura.

Madeira He branca amarelhada, fina, eija, e boa de trabalhar se.

Uzo A casca da raiz fervida em agua, e adoçada, sedá a gente, e aos animaes nas doencas malignas como Eufresario, e com este remedio julgão poupar sangrias.

Peso especifico..... 0,750

III


[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]



[Partial view of handwritten text from the adjacent page, including words like "ey", "Sa", and "Al"]

N 144



Gambui do Campo

Folhas, *Folia cersilia, opposita, lanceolata, acuminata,*
e galhos *auriculata, integra.*

De ambos os lados são lisas, no superior mais escuras, que no inferior. Os galhos oppositos, e a casca dos novos de cor bruna clara.

Tamanho He arvore de 1 palmo de diametro, e mal feita.

Casca A casca na superficie he lisa, como a do Gambui, e estando verde, he de cor verde; secando, fica bruna clara; no interior tambem he verde, e secando fica de cor branca suja; de $\frac{1}{3}$ de linha de grossura.

Madeira A madeira he branca avermelhada, eja, bastante mente fina, e boa de se tachar.

Uzo Nenhum.

Peso especifico 0,888.





Camelêao

Folhas, e galhos *Folia alterna, petiolata, ovata, acuminata, tomentosa, integra.*

Os galhos novos são alternados, a casca verde, e cabelluda.

Tamanho *He arvore de hum palmo de diametro, pouco conhecida, e mal feita.*

Casca *A casca na superficie he bruna negra, rachada longitudinalmente, lamellosa, e solta; no interior, estando verde, he amarellada, secando, fica cor de canella, de 3, a 4 linhas de grossura.*

Madeira *A madeira verde he branca, fica depois amarellada, e muda finalmente a cor em vermelho bruno e sujo; não he cija, tem fibras grossas, e nodos como gucimaduras, e he má de se trabalhar.*

Uxo *Nenhum*

Peso especifico 0,777



Arvores de Campo, que me foram? remettidas,
sem que eu pudesse fazer a descripção dellas

N¹⁴⁶ Candieia amarella.

N¹⁴⁷ Candieia branca.

N¹⁴⁸ Candieia do Campo.



N 149



Mangabeira brava



- N 150..... Cascuda
N 151..... Murissi com folha aspera
N 152..... Murissi com folha lisa
N 153..... Barbatimão
N 154..... Lacheta.
-

Palmeiras, ou Coqueiros

- N 155..... Coqueiro de Giribá
N 156..... Guariroba

Tem pouca differença do Giribá; a casca
he mais grossa, e o grêllo, que frequenter^{te}
se come, he amargo.



Cipós, ou Trepadeiras

Cipó-pão

Tamanho Tem de 1 até 1½ palmas de diametro, e de 500, até 600 palmas de comprimento, enlaçando se entre, e sobre muitas outras Arvores, de maneira que he difficil cultoso achar-se o seu fim.

Casca A casca he branca grixca, lisa, e com pequenas excrecencias aqui, e acolá; no interior he verde clara, e mui delgada.

Madeira A madeira he branca, muito molle, e as suas camadas annuaes são testaceas.

Uzo Nenhum

Preo especifico 0,685





Cipó Jacaranda

Folhas, e galhos *Folia alterna, impari pinnata; foliolis petiolatis, alternis, lanceolatis, integris.*

De ambos os lados são lisas; do superior mais claras, que do inferior. A casca dos galhos novos he bruna clara.

Tamanho He cipó, que trepa de hum a arvore a outra, de comprimento de 100, a 500 palmos.

Casca Na superficie he a casca branca grizca, e finamente folhetada; no interior he bruna clara, de 3 linhas de grossura.

Madeira A madeira he branca suja, com cerne avermelhado, e circulado de riscas vermelhas escuras.

Uzo Nenhum.

Peso especifico. 0,600


N. 159

Parchino

N. 160

Salsapilla







Eschewege

Descrição florestal da collec-
ção de madeiras dos sertões do
Rio Abaethé. 1819

561/58

581.981

E 74
634.920981

Emprést.º

Assinatura

5449
Devolução

4.9.59

Encadernação

27-5-63

Exposição

julho 63

14/10/98

CONSULTADO
(M.C.)

14/10/98